

Slik hindrer du spredning av **Gyrodactylus Salaris**

Spredning av Gyrodactylus Salaris er en konstant trussel for lakseførende vassdrag, og det er derfor viktig at alle fiskere og andre friluftsfolk bidrar aktivt til å forhindre dette. – Nedenfor har vi gitt noen ”kjøreregler” som skal forhindre smittepredning.

Tørking av utstyr

Sørg for at alt får tørke i en minimumstemperatur på 20°C i minst to dager, eller varm opp i minst en time i en temperatur på over 60°C. - Alternativt kan utstyret dypfrysese i minst en dag.

Desinfisering av utstyr

For sikkerhets skyld ber vi om at alle som kommer med fiskeutstyr, båter eller annet utstyr fra andre vassdrag og til et nytt vassdrag alltid sørger for å desinfisere dette.

Desinfeksjon av utstyr mv. kan for eksempel skje ved hjelp av Virkon-S. Virkon-S fåes kjøpt på Fellekjøpet i pulverform, og løses opp i vann til en 0,5 - 1% løsning. Løsningen kan sprayes på utstyr og skylles av etter ca. 15 minutter. Erfaring har vist at dette ikke skader fiskeutstyret.

Det er etablert desinfeksjonsstasjoner i de fleste vassdrag, og langs Namsen finnes flere slike. I Salsvassdraget vil guidene på de forskjellige gårdene normalt være behjelpelig med desinfeksjon av utstyret. – Kafe Elgen på Salsbruket kan sannsynligvis også være behjelpelig med dette.

Andre forholdsregler

I tillegg til fiskeutstyr er det viktig å være klar over at også flytting av båter, campingvogner, gummibåter, madrasser, badeutstyr, rafting, kajakk- og kanopadling kan føre med seg smitte. Husk derfor følgende:

- desinfiser alt som skal brukes i direkte tilknytning til vann i et nytt vassdrag
- tøm ikke ut vann fra annet vassdrag (fra campingvogn, vannkanner el) i et nytt vassdrag
- vask og sløy fisken der du fanger den
- Sett ikke ut fisk uten godkjent helse- og opprinnelsesattest fra veterinær.

Mattilsynets distriktskontorer, telefon 06040, kan svare på spørsmål om Gyro og smittespredning.

Bangsund den 01.06.07 / TE

